結膜炎

=11

CMER CMER 希瑪眼科

- http://www.hkcmereye.com
- 中環銅鑼灣旺角尖沙咀觀塘 沙田元朗荃灣將軍澳

甚麼是結膜炎?/ WHAT IS CONJUNCTIVITIS?

結膜炎俗稱「紅眼症」,指覆蓋著眼白、眼瞼內方及眼球表面 的半透明薄膜發生炎症,薄膜會變成粉紅色或紅色。較常見 由病毒引起,細菌性感染或過敏反應亦是造成結膜炎的原 因。任何人均可能染上結膜炎,兒童更較常受到感染。

結膜炎症狀 / SYMPTOMS







結膜充血

眼瞼紅腫、沉重

眼睛痕癢、疼痛







異物感、燒灼感

流眼水、畏光

分泌物增多













結膜炎種類 / TYPES



病毒性結膜炎

通常與上呼吸道感染有關,由病毒引起,主要病原體為腺病毒及腸病毒。這種結膜炎傳染性高,但通常在數日內,不需要治療的情況下自行復原。



細菌性結膜炎

由多種細菌引起,最常見有流感嗜血桿菌和肺炎鏈球菌,其中衣原體感染令初生嬰兒和成人患上細菌性結膜炎。若不及時治療,細菌性結膜炎所感染的細菌可造成眼睛嚴重的傷害。



過敏性結膜炎

過敏性結膜炎是常見的眼疾。當眼睛受致敏原、微生物及環境中的刺激物而發炎時,免疫系統會針對致敏原產生過度的免疫反應,使結膜裡的血管腫脹,以致眼睛發紅。

以下是常見**過敏性結膜炎的種類**:

季節性過敏性結膜炎

多數發生於季節轉換時,常見致敏原是秋冬季的霉菌孢子及 春夏交替時的植物花粉。本身有過敏體質的會更容易患上此 病,例如:氣喘、過敏性鼻炎等。

常年性過敏性結膜炎

致敏原多數是空氣中的污染物、灰塵、塵蟎或動物毛屑等,過敏症狀一年四季都可能發生,但症狀多較輕微。

巨柱狀敏感性結膜炎

屬長期使用隱形眼鏡常見引起的併發症。由於隱形眼鏡對眼睛來說,屬於異物,長期配戴有可能使得結膜表面發生改變, 變得凹凸不平,引起不適症狀。所以若在選擇、驗配、配戴或護理上處理不當,便有機會出現併發和後遺症。

傳播途徑 / MODE OF TRANSMISSION

結膜炎分為傳染性及非傳染性。病毒性和細菌性結膜炎屬傳染性,傳染力極高,主要透過與患者親密接觸,或間接接觸到受污染的物品均可致病。

常見的傳染途徑:



雙手接觸患者的眼睛或 上呼吸道的分泌物傳播



透過患者個人日用品,如毛巾、衣物、 眼部化妝品或眼藥水等交叉感染



如游泳人士在受污染的水源游泳, 也有機會受感染



當病毒入侵眼睛,會經過一段潛伏期後才發病,潛伏期 為1至12天不等,由病發至康復需要大約10天至數星期。

高危人士 / RISK FACTORS



5歲或以下 兒童及嬰幼兒



有眼或 鼻敏感患者



抵抗力 較差人士



經常觸摸 雙眼人士



長時間配戴



長時間注視 電子螢幕人士

結膜炎治療 / TREATMENT

病毒性 結膜炎

一般情況下,病毒性結膜炎患者會在大約 1星期內痊癒,毋須特別治療。如要紓緩 不適的症狀,患者可多作休息,將冷濕的 毛巾敷在眼睛上,一日數次。

細菌性 結膜炎

治療細菌性結膜炎,一般以醫生處方藥物作治療,例如:含抗生素的眼藥水或眼膏。

過敏性 結膜炎

如屬於因接觸致敏源而導致的結膜炎,避免接觸致敏源可減輕症狀或減少發作。若因配戴隱形眼鏡所引起則需要停戴。此外,臨床上亦可透過用藥控制過敏性結膜炎的反應。

預防結膜炎 / PREVENTION



避免出入 高危地方



避免共用 個人物品



避免接觸 過敏原



徹底清潔 隱形眼鏡



觸摸眼睛前 要先洗手



眼科

牙科

醫美



眼科查詢及預約熱線:3956 2026

銅鑼灣 CAUSEWAY BAY

旺角

尖沙咀

沙田

元朗

觀塘 (WUN TONG 荃灣

將軍澳

中環

銅鑼灣

肝角

尖沙咀

觀塘

沙田

元朗

荃灣

將軍澳